

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Grandes cultures

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES

CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13, ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS - TEL (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL 92 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.  
Sous Régisseur de recettes et d'avances  
AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN N°46 (5/84)

du 5 AVRIL 1984

REPONDEURS TELEPHONIQUES

Suite à la mise en place de répondeurs téléphoniques qui permettent plusieurs appels simultanés, les numéros actuellement en service pour les renseignements agrométéorologiques sont les suivants :

16 : COGNAC 82.65.43  
RUFFEC 31.05.94

79 : PARTHENAY 64.10.94

17 : LA ROCHELLE 41.43.42  
SAINTES 93.13.33  
MIRAMBEAU 49.60.82

86 : POITIERS 58.47.06  
CHATELLERAULT 21.14.14

## COLZA



### PUCERONS CENDRES



Des colonies importantes sont signalées à Brie (16), et Villiers/Chizé (79). En d'autres endroits on observe leur présence.

Le stade sensible couvre toute la période de végétation jusqu'à la récolte. Le développement éventuel de ces colonies est à surveiller.

Lorsque deux colonies par m<sup>2</sup> sont observées en bordure des champs, un traitement localisé est nécessaire. Si l'infestation est plus importante et que le printemps est sec (les dégâts sont alors accentués) toute la parcelle pourra être protégée.

Utiliser le bromophos méthyl (500 g m.a/ha) ou le pirimicarbe (250 g m.a/ha).



### INSECTES DES BOUTONS FLORAUX

Les méligèthes sont capturés régulièrement dans les cuvettes et les tous premiers charançons des siliques sont apparus. Malgré tout, les conditions des derniers jours n'ont pas été favorables à l'activité de ces insectes : tous les sondages montrent des populations peu importantes sur les inflorescences (moins de 10 insectes pour 50 pieds). Il est conseillé d'attendre des conditions plus propices et de faire des contrôles au champ lors des journées ensoleillées :

- . Au stade boutons accolés; le seuil d'intervention est d'un insecte par pied en moyenne.
- . Au stade boutons séparés, le seuil d'intervention n'est plus que de deux à trois insectes par pied.
- . A l'apparition des premières fleurs, il n'y a plus de risque dû aux méligèthes.

P.1.8

**NB.** Depuis la parution du dernier bulletin, le fenvalerate a reçu une autorisation de vente sur charançon des siliques à la même dose que sur méligèthe (40 g de m.a/ha).

### POURRITURES

La pourriture de pieds, observée depuis quelque temps est due à plusieurs causes :

- dans quelques cas, attaques précoces de sclérotinia.
- le plus souvent, attaques de Botrytis (duvet blanc-gris) s'installant sur des pieds déjà affaiblis. Des analyses sont en cours pour expliquer l'origine de ces affaiblissements.

## **CEREALES**

L'ensemble des cultures en est encore au redressement, le premier noeud étant rarement visible.

### **➤** MALADIES du BLE

Les indications du dernier bulletin sont confirmées :

- . piétin verse ou rhizoctone présents dans quelques situations.
- . présence généralisée de la septoriose sur les feuilles de la base.
- . rouille brune très rare.

A l'exception de parcelles précoces très attaquée par le piétin-verse, il est inutile et même dangereux d'intervenir avant 10 à 15 jours. A partir du stade 1-2 noeuds une protection contre le piétin-verse est à envisager si au moins 15 % des talles sont atteintes. Choisir un produit polyvalent qui permette de limiter la septoriose.

### **➤** MALADIES de l'ORGE

La rhynchosporiose est présente dans de nombreuses situations. Une protection s'avère nécessaire à partir de maintenant sur les parcelles atteintes. Choisir le produit en fonction de la présence ou non de rouille brune ou d'oïdium.

### **➤** ADDITIF FONGICIDES

Dans le tableau présenté dans notre précédent bulletin, il convient de noter que l'IMPACT R assure, comme les autres produits de son groupe, une bonne efficacité sur piétin-verse. D'autre part, il est conseillé d'utiliser ce produit ainsi que l'IMPACT TP à 25 % ou plus de la dose homologuée quand une protection anti-rouille est recherchée.

## **TOUTES CULTURES**

### **➤** CAMPAGNOLS des CHAMPS

Les prévisions de l'avis du 2 Mars restent valables.

Toutefois, outre les foyers habituellement connus, des dégâts localisés sont observés avec notamment des pénétrations dans les blés :

- . Charente-Maritime : secteurs de Surgères et de Saint Agnant
- . Deux-Sèvres : secteurs de Niort et de Melle
- . Vienne : secteurs de Couhé-Chaunay

Il convient donc de rester vigilant: intervenir le plus rapidement possible, si nécessaire.



# MAIS - TOURNESOL

RAVAGEURS SOUTERRAINS : un problème de rotation

Les prairies et les fourrages pluriannuels favorisent les ravageurs souterrains. Après de tels précédents, il faut envisager une lutte quasi systématique contre le taupin. Utiliser le lindane à 1500 g de m.a/ha en traitement en plein 10 jours avant le semis. Lorsque d'autres ravageurs sont à craindre : scutigerelles, oscinies, nématodes ... intervenir avec des produits plus polyvalents.

## PRODUITS UTILISABLES en TRAITEMENT de SOL

| Matière active et dose<br>hectare            | Spécialités<br>Commerciales    | R A V A G E U R S    |               |             |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
|  |                                | Larves de<br>taupins | Scutigerelles | Oscinies    |
| TRAITEMENT en PLEIN                          |                                |                      |               |             |
| lindane - 1500 g                             | Nombreuses                     | + + +                | 0             | 0           |
| chlorpyriphos + lindane<br>1500 g + 800 g    | Lorsban L 16<br>Kregan         | + + +                | + + +         | -           |
| ethoprophos - 4000 g                         | Mocap 20 CE<br>(pulvérisation) | + + / + + +          | + + / + + +   | +           |
| parathion 10.000 g                           | Nombreuses                     | + + / + + +          | + + / + + +   | +           |
| TRAITEMENT en LOCALISATION                   |                                |                      |               |             |
| bendiocarbe - 300 g                          | Garvox 3 G et<br>Niomyl 3 G    | + + +                | + + / + + +   | + +         |
| benfuracarbe - 600 g (2)                     | Oncol 5 G                      | + + +                | + + +         | + + +       |
| carbofuran - 600 g (2)                       | Curater                        | + + +                | + + +         | + + +       |
| carbosulfan - 500 g (2)                      | Marshall 5 G                   | + + +                | + + +         | + +         |
| chlorméphos - 300 g                          | Dotan                          | + + +                | + + +         | + + / + + + |
| chlorpyriphos - 500 g                        | Dursban                        | + + / + + +          | + + / + + +   | + / + +     |
| chlortiphos + lindane<br>237,6 g + 136 g     | Celathion L                    | + + / + + +          | + + / + + +   | + +         |
| fonophos 350 g                               | Dyfonate 5 G                   | + + / + + +          | + + / + + +   | + / + +     |
| fonophos + lindane<br>200 g + 100 g          | Dyfonate L 3 G<br>Folane       | + + / + + +          | + + / + + +   | +           |
| parathion + chlorfenvinphos<br>500 g + 500 g | Birlane mixte                  | + + / + + +          | + +           | +           |
| phoxime - 600 g                              | Volaton 5<br>Agridine 5 G      | + +                  | + + / + + +   | +           |
| terbuphos - 200 g (2)                        | Counter 2 G                    | + + +                | + + / + + +   | + +         |
| aldicarbe + lindane(1)<br>500 g + 200 g      | Témik M                        | + + / + + +          | + + / + + +   | + + +       |

Légende :      0 : inefficace      + + + : très efficace  
                      + : peu efficace      - : efficacité non connue  
                      + + : moyennement efficace

(1) le TEMIK M est en outre autorisé contre les nématodes

(2) ces produits ont une action contre les nématodes.

# TOURNESOL

## DESHERBAGE

Le tournesol est très sensible à la concurrence des mauvaises herbes jusqu'au stade 5-6 paires de feuilles.

Pendant une période de 30 à 40 jours, le tournesol doit donc être protégé. Cette protection peut être complétée, après la levée, par un binage mécanique.

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des desherbants utilisables sur tournesol :

| TRAITEMENTS  | Dose/ha<br>produit<br>formulé          | Epoque<br>d'application                       | OBSERVATIONS  |
|--|--|---|---|
| TREFLAN<br>(trifluraline)  | 2,5 l/ha                               | présemis<br>incorporé                         | L'incorporation doit être immédiate et profonde (6 à 8 cm). L'efficacité est peu dépendante des conditions climatiques (pluviométrie) après semis. Contrôle bien les renouées, les chénopodes, les graminées estivales mais est faible sur crucifères et matricaires.                 |
| puis<br>formulation à base<br>de linuron à 50 %                                      | 1 kg/ha<br>de produit<br>formulé à 50% | prélevée dans<br>les 48 heures<br>après semis | L'efficacité du linuron est renforcée en cas de pluie après traitement. Le linuron améliore l'efficacité sur crucifères.  |
| CAPSOLANE<br>(E P T C)   | 8 l/ha                                 | présemis<br>incorporé                         | Incorporation dans la journée (produit microencapsulé).   |
| puis<br>QUINOTER<br>linuron + monolinuron,   | 1 kg/ha                                | prélevée<br>après semis                       | L'association est faible sur renouées, mercuriale, folle-avoine.  |
| AVADIX<br>(diallate)   | 3,5 l/ha                               | présemis<br>incorporé                         | Incorporation immédiate sur 6 cm de profondeur, sur sol fin bien préparé (herse lourde par passages croisés). C'est un graminicide qu'il faut compléter avec l'Igrane.  |
| puis<br>IGRANE<br>(terbutryne)   | 4 l/ha                                 | prélevée dans<br>les 48 heures<br>après semis | A éviter dans les sols battants<br>Ne pas dépasser 3 l/ha en terres légères ou filtrantes<br>Augmenter la dose à 5 l en sol argileux<br>L'efficacité est renforcée en cas de pluie après traitement.  |
| LINAMEX<br>(butraline +<br>linuron)  | 10 l/ha                                | prélevée dans<br>les 48 heures<br>après semis | L'efficacité de ce produit est renforcée en cas de pluie après traitement<br>Pour que l'efficacité soit régulière, réduire le délai entre les dernières façons culturales et le traitement<br>Contrôle bien les graminées estivales mais est faible sur vulpin, mercuriale, renouées. |
| LEGURAME PM<br>(carbétamide)   | 3 kg/ha                                | prélevée                                      | Contrôle bien les graminées estivales, les chénopodes mais est faible sur amarantes, mercuriales.   |
| RONSTAR<br>(oxadiazon)   | 3 l/ha                                 |   |   |
| Un seul herbicide est utilisable en post-levée : le FERVIN qui est un antigraminées. |  |   |   |
| FERVIN<br>(alloxydime Na)  | 1 kg/ha<br>+<br>3 l d'huile            | postlevée                                     | Ce produit a une meilleure efficacité lorsqu'il est appliqué par temps poussant. Le soir si possible.<br>Les paturins sont résistants.<br>Pour les chiendents, mettre 1,5 kg/ha   |